



가 정 통 신 문

인천정각중학교 문화예체능부

교 훈

좋은 생각
바른 행동

인천광역시 남동구 구월로 240 인천정각중학교 / TEL:770-1700 / 홈페이지 <http://jeonggak.icems.kr/>

홍역 예방 안내문

학부모님 안녕하십니까?

최근 해외 교류 증가에 따라 홍역 감염이 급증함에 따라 홍역 예방 및 전파 차단에 대해 안내드리오니 협조하여 주시기 바랍니다. 아울러, 시기별 유행하는 감염병, 입학 전 챙겨야 하는 예방접종 등 감염병 안내문을 참고하시어 손 씻기, 기침 예절, 호흡기 증상 시 마스크 착용 등 개인 위생수칙을 철저히 지킬 수 있도록 가정에서도 학부모님들의 지도 부탁드립니다.

1. 홍역 예방 안내

홍역의 특징	홍역 의심 증상	고열과 함께 피부 발진 이 나타나고, 기침, 콧물, 결막염 이 동반될 수 있습니다	
	전염성	홍역은 전염력이 매우 강하며 항체가 없는 사람이 노출되었을 때 90% 이상이 감염됩니다.	
	감염경로	환자와 직접 접촉하거나 호흡기 분비물 등을 통해 감염됩니다.	
	전염 기간	환자에서 피부 발진이 발생하기 4일 전부터 발생 후 4일까지 홍역바이러스가 전파될 수 있습니다.	
	잠복기	바이러스에 감염되어 증상이 나타나기까지의 기간은 7~21일(평균 10~12일)입니다.	
	예방접종	홍역은 MMR(홍역·유행성이하선염·풍진) 백신 2회 접종 으로 효과적으로 예방할 수 있습니다.	
예방접종 안내	자녀가 홍역(MMR) 예방접종을 받은 적이 없고 홍역을 앓은 적이 없는 경우 의사와 상의하여 홍역 예방접종을 받도록 합니다. 홍역 환자와 접촉한 후에도 3일 안에 예방접종을 하면 발병을 예방할 수 있으며, 발병하여도 증상 완화 효과가 있습니다.		
자녀가 홍역에 걸렸거나 의심될 경우	1. 홍역(의심) 증상이 있는 경우 등원·등교를 중지 하고, 마스크를 착용한 후 의료기관에서 진료(대중교통 이용금지)받도록 합니다. * 발열, 발진과 함께 기침, 콧물, 결막염 등의 증상이 동반하는 경우 2. 의료기관 진료 결과, 홍역(의심) 진단받으면 학교에 감염사실을 알리고, 전염 기간(발진 발생 전 4일부터 발진 후 4일까지) 동안 등교를 중지 하고 학원 등 사람이 많이 모이는 장소에 가지 않습니다. 3. 가족 중에 12개월 이하 영유아나 임신부, 면역기능이 저하된 사람이 있는 경우 즉시 의사와 상의합니다.		

2. 입학 전 챙겨야 할 예방접종

대상 감염병	백신 종류	4세	6세	11세	12세
디프테리아 파상풍 백일해	DTaP	DTaP 5차			
	Tdap/Td			Tdap/Td 6차	
폴리오	IPV	IPV 4차			
홍역 유행성이하선염 풍진	MMR	MMR 2차			
일본뇌염	IJEV(불활성화 백신)		IJEV 4차		IJEV 5차
	LJEV(약독화 생백신)	LJEV 2차 * 접종 권장연령(생후 24~35개월)에 접종하지 못했어도 빠른 시일 내 접종 권장			
사람유두종 바이러스감염증	HPV			HPV 1차~2차	



**예비 초등학생
백신 4종 추가접종**



**예비 중학생
백신 3종 추가접종**

✓ **예비 초등학생 (입학 전 4~6세에 권고 백신 4종 추가접종)**

- DTaP 5차
- IPV 4차
- MMR 2차
- 일본뇌염 불활성화 백신 4차 또는 약독화 생백신 2차

* DTaP-IPV 4차를 접종한 경우 DTaP 5차와 IPV 4차 접종을 완료한 것과 동일

✓ **예비 중학생 (입학 전 11~12세에 권고하는 백신 3종 추가접종)**

- Tdap(또는 Td) 6차
- 일본뇌염 불활성화 백신 5차 또는 약독화 생백신 2차
- HPV 1차(여학생 대상)

3. 기타 주의가 필요한 감염병

수두 ○ 수두바이러스에 의한 급성 발진성 감염병 ✓ 감염경로 - 환자의 수포액과 직접 접촉 (피부 병변이 주요 감염 전파원) - 환자 호흡기 분비물, 급성 수두 또는 대상포진 환자의 피부병변 수포액 에어로졸 흡입 ✓ 증상(호발연령: 대부분 15세 미만) - 감수성이 있는 사람 대부분 발진이 나타남 ✓ 예방법 - 예방접종(소아) - 생후 12~15개월에 수두 백신 1회 접종 13세 이상 미접종자는 4~8주 간격 2회 접종	유행성이하선염 ○ 유행성이하선염 바이러스 감염에 의한 발열성 질환 ✓ 감염경로 - 비말전파, 오염된 타액과 직접접촉 - 아하선염 발현 3일 전부터 발현 후 5일까지 전염 기간 ✓ 증상(호발연령: 4~12세 학령기) - 발열, 편측 혹은 양측 이하선의 종창·통증이 특징 - 약 20%는 무증상 감염자이며, 일반적으로 30~40%에서 이하선을 침범 ✓ 예방법 - 예방접종(소아) - 생후 12~15개월, 4~6세에 MMR 백신 2회 접종
수족구병 ○ 엔테로바이러스 감염에 의한 질환 ✓ 감염경로 - 직접접촉이나 비말을 통해 사람 간 전파 (분변-경구 및 호흡기 경로) ✓ 증상 (호발연령: 10세 미만, 특히 5세 이하 영유아) - 발열, 식욕부진, 인후통, 무력감 - 혀, 잇몸, 뺨의 안쪽, 입천장 등에 통증성 피부병변 ✓ 예방법 - 올바른 손 씻기 - 기침 예절 지키기 - 장난감, 놀이기구, 집기 등 청결유지 - 수족구병 환자와 접촉 피하기	백일해 ○ 백일해균 감염에 의한 급성 호흡기 질환 ✓ 감염경로 - 환자 또는 보균자의 비말 감염에 의해 전파, 전염성이 강함 ✓ 증상(호발 연령: 전 연령) - 급성 호흡기감염병, 발작성 기침이 특징적 (발열은 심하지 않음) ✓ 예방법 - 예방접종(소아) - 생후 2, 4, 6개월에 DTaP 백신 기초접종 - 생후 15~18개월, 4~6세에 DTaP 백신 추가접종 11~12세에 Tdap 백신 추가접종 * 매 10년마다 Tdap 또는 Td 백신 추가접종

2024. 4. 22.

인 천 정 각 중 학 교 장